

**Prima segnalazione per la Sardegna di *Tachyporus obtusus*  
(Linné, 1767) (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporini)**

**Jan Matějček<sup>1</sup>, Davide Cillo<sup>2</sup> & Erika Bazzato<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Formankova 436, 50011 Hradec Králové (CZ), Repubblica Ceca. Email: honzama@tiscali.cz

<sup>2</sup> Via Zeffiro 8, 09126, Cagliari (CA), Italia. Email: davide.cillo@hotmail.it

<sup>3</sup> Autore corrispondente: Via Madonna di Campiglio 22, 09045, Quartu S.E. (CA), Italia. Email: erika.bazzato@hotmail.it

[urn:lsid:zoobank.org:pub:509D4E00-397A-4E5A-A692-8D3538EC0C38](https://zoobank.org/pub:509D4E00-397A-4E5A-A692-8D3538EC0C38)

**Riassunto:** Con la presente nota viene segnalata per la prima volta la presenza di *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767) in Sardegna, grazie al ritrovamento di un esemplare reperito mediante raccolta a vista, in una zona portuale urbana.

**Parola chiave:** *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767), Coleoptera, Staphylinidae, Sardegna, Italia.

**Primera señalización para Cerdeña de *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767) (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporini)**

**Resumen:** Con esta nota se señala la presencia de *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767) por primera vez en Cerdeña gracias a la captura "a mano" de un individuo en una zona portuaria urbana.

**Palabras clave:** *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767), Coleoptera, Staphylinidae, Cerdeña, Italia.

#### INTRODUZIONE

Il genere *Tachyporus* Gravenhorst, 1802 è rappresentato nella penisola italiana da diciannove specie, di cui due di dubbia presenza (Ciceroni *et al.*, 1995). In Sardegna, il genere conta invece un'entità dubbia (*Tachyporus scitulus* Erichson, 1839) e otto di presenza accertata: *Tachyporus abdominalis* (Fabricius, 1781); *Tachyporus abner* Saulcy, 1864; *Tachyporus caucasicus* Kolenati, 1846; *Tachyporus formosus* Matthew, 1838;

#### INTRODUCCIÓN

El género *Tachyporus* Gravenhorst, 1802 está representado en la península italiana por diecinueve especies, de las que dos son de presencia dudosa (Ciceroni *et al.*, 1995). En Cerdeña, el género cuenta igualmente con una especie dudosa (*Tachyporus scitulus* Erichson, 1839) y ocho de presencia cierta: *Tachyporus abdominalis* (Fabricius, 1781); *Tachyporus abner* Saulcy, 1864; *Tachyporus caucasicus* Kolenati, 1846; *Tachyporus formosus* Matthew, 1838;

*Tachyporus hypnorum* (Fabricius, 1775);  
*Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781);  
*Tachyporus pusillus* Gravenhorst, 1806;  
*Tachyporus solutus* Erichson, 1839  
(Ciceroni *et al.*, 1995).

La presente nota rappresenta la prima segnalazione per l'isola di *T. obtusus* (Linné, 1767). La specie si aggiunge a quelle già note per la regione, grazie al recente ritrovamento di un esemplare catturato nella zona settentrionale dell'isola.

L'areale di distribuzione di *T. obtusus* (Linné, 1767) è ampio e comprende diversi territori europei e asiatici. In Europa è specificatamente presente in: Austria, Belgio, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia (territori europei settentrionali e meridionali), Slovakia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Ucraina (Smetana, 2004). È inoltre presente nei seguenti territori asiatici: Armenia, Russia (est Siberia), Russia (lontano est), Russia (ovest Siberia) (Smetana, 2004).

#### **MATERIALI E METODI**

La specie è stata reperita mediante raccolte a vista, mentre vagava nel terreno in una zona urbana della periferia di Golfo Aranci (Sardegna settentrionale).

#### **RISULTATI E DISCUSSIONI**

Si riporta il dato inedito di ritrovamento, reperito in una zona urbana della Sardegna settentrionale.

*Tachyporus hypnorum* (Fabricius, 1775);  
*Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781);  
*Tachyporus pusillus* Gravenhorst, 1806;  
*Tachyporus solutus* Erichson, 1839  
(Ciceroni *et al.*, 1995).

La presente nota significa la primera cita para la isla de *T. obtusus* (Linné, 1767). Esta especie se une a las ya conocidas para la región, gracias a la reciente captura de un ejemplar en la zona norte de la isla.

El área de distribución de *T. obtusus* (Linné, 1767) es amplia a lo largo de diversos territorios europeos y asiáticos. En Europa se encuentra presente en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia (territorios europeos septentrionales y meridionales), Suecia, Suiza, Ucrania y Yugoslavia (Serbia y Montenegro), (Smetana, 2004). También está presente en los territorios asiáticos de Armenia, Rusia (Siberia occidental, oriental y lejano oriente) (Smetana, 2004).

#### **MATERIALES Y MÉTODO**

La especie se encontró mediante recolección "de visu", mientras correteaba en el terreno de una zona urbana de la periferia de Golfo Aranci (norte de Cerdeña)

#### **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

Se ofrece el dato inédito de la captura en una zona urbana del norte de Cerdeña

***Tachyporus obtusus*** (Linné, 1767)

SARDEGNA: Provincia Olbia Tempio, Golfo Aranci (porto), 23.IV.2015, 1 es., Matějčíček J. leg. (coll. Matějčíček J.).

La specie in natura frequenta diversi ambienti, quali ad esempio le rive dei corsi d'acqua, i prati umidi o i corpi fruttiferi dei funghi, si ritrova inoltre anche nel terreno tra i detriti o sotto il fogliame.


Considerando la località di ritrovamento, sita nella zona urbana in prossimità dell'area portuale, non si esclude che la specie possa essere stata introdotta accidentalmente tramite i trasporti navali.

***Tachyporus obtusus*** (Linné, 1767)

Cerdeña: Provincia Olbia Tempio, Golfo Aranci (puerto), 23.IV.2015, 1 ex., Matějčíček J. leg. (coll. Matějčíček J.).

La especie, en la naturaleza, frequenta diversos ambientes como las riberas de cursos de agua, prados húmedos o los cuerpos fructíferos de hongos, y también en el terreno entre los detritos y bajo la hojarasca.

Considerando la localidad de captura, ubicada en una zona urbana en la proximidad de un área portuaria, no se excluye que la especie haya podido ser introducida accidentalmente con el tráfico marítimo.



**Fig. 1.** Sinistra: *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767). Destra: Carta Sardegna, in nero località di ritrovamento./ Izquierda: *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767). Derecha: Mapa de Cerdeña mostrando la ubicación de la localidad de captura

Jan Matějčiček *et al.* Prima segnalazione per la Sardegna di *Tachyporus obtusus* (Linné, 1767)  
(Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Tachyporini)

---

#### BIBLIOGRAFIA

- Ciceroni, A., Puthz, V. & Zanetti A., 1995.** *Coleoptera Staphylinidae*. In: Minelli, A., Ruffo, S., & La Posta S., (eds.), *Checklist delle specie della fauna italiana*. 48. Calderini, Bologna, 65 pp.
- Smetana, A., 2004.** *Staphylinidae*. In: I. Löbl & A. Smetana (eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. II. Hydrophiloidea- Histeroidea- Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.: 551.

---

**Recibido:** 16 mayo 2016  
**Aceptado:** 23 mayo 2016  
**Publicado en línea:** 24 mayo 2015